

# XXVII

# Jornada Gastroenterològica de les Comarques Catalanes

Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi

Sant Joan Despí, 9 de Maig de 2015

Consorci  
Sanitari Integral

DIGESTOLÒGS  
COMARCALS  
CATALUNYA



## AVALUACIÓ DE LA EFICÀCIA I EFICIÈNCIA DE LA LLIGADURA HEMORROÏDAL PER ENDOSCÒPIA RESPECTE EL TRACTAMENT QUIRÚRGIC

Carles Pons; A.Belen Vega; Joana Villaverde; Antonia Perelló; Aurora Falcó; Lorena Rodríguez; Agueda Abad; Mercè Barenys.

*Servei d' Aparell Digestiu, Hospital de Viladecans (Viladecans).*

### Introducció:

La lligadura hemorroïdal amb bandes, s'ha demostrat igual d'eficaç que la cirurgia, però amb un menor índex de complicacions i sense llistes d'espera. No existeixen estudis sobre l'estalvi econòmic del procediment respecte a la cirurgia.

### Material i mètodes:

Revisió retrospectiva desembre 2013 fins gener 2015 de pacients amb sagnat hemorroïdal grau I-II-III, fracàs mesures habituals. Remesos de cirurgia de pacients en llista de espera i del servei d'aparell digestiu. Exploracions sense sedació, de forma ambulatoria, sense ingrés, utilitzant un gastroscopi convencional i bandes COOK®.

### Resultats:

30 pacients, 20 homes (66%) i 10 dones (34%). Mitjana de 60 anys (33-85). Procedents de digestiu 7 (23%) i 23 (77%) de cirurgia. Mitjana de bandes de 3. Temps mig duració procediment 15 minuts. 26 no recidiva (86%), 1 (3%) recidiva resolta amb esclerosi, 1 (3%) resolt amb noves bandes i 2 (6%) recidiva resolta amb cirurgia. Síntoma més freqüent dolor post-procediment (85%). No complicacions majors, només un pacient amb trombosi hemorroïdal (3%). El tractament endoscòpic va ser eficaç en el 93% del pacients (28/30) similar a estudis anteriors. Impacte econòmic de tots els procediments endoscòpics de 4.898 € (31 procediments x bandes i endoscòpia 158 €) i dos pacients intervinguts (3560€) en contra de 53.400 € (1780€ intervenció + 1 dia hospitalització x 30 pacients) si tots són operats amb un estalvi econòmic de total de 44.942 €.

### Conclusions:

El tractament amb bandes, es pot realitzar de manera ambulatoria. El procediment s'ha demostrat igual d'eficaç en el tractament dels símptomes de sagnat hemorroïdal que la cirurgia, sense cap complicació major, amb un estalvi econòmic important, sense temps d'espera i ha permès disminuir les llistes de espera de pacients ja pendents d'intervenció. La presència de dolor post-procediment ens ha obligat a fer un protocol de analgèsia i major informació al pacient.

