

XXVII

Jornada Gastroenterològica de les Comarques Catalanes

Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi

Sant Joan Despí, 9 de Maig de 2015

Consorti
Sanitari Integral

DIGESTOLÒGS
COMARCALS
CATALUNYA



HEMORRÀGIA DIGESTIVA ALTA RECIDIVANT PER VARICES DUODENALS

Joana Villaverde; Carles Pons; Ana Belen Vega; Lorena Rodríguez; Antònia Perelló; Aurora Falcó; Àgueda Abad; Mercé Barenys. Servei d' Aparell digestiu.

Hospital de Viladecans

Introducció:

Les varices ectòpiques són aquelles no localitzades als territoris habituals (esòfago-gàstriques) i són responsables de fins el 5% dels episodis d'hemorràgia per varices. Les duodenals són les més freqüents (17%). No existeixen estudis aleatoritzats que evaluin diferents alternatives terapèutiques i el tractament sol ser individualitzat i dependent de l'experiència del centre.

Cas clínic:

Pacient de 83 anys amb cirrosi per VHC descompensada en múltiples ocasions que ingressa per HDA. L'endoscòpia digestiva alta objectiva una lesió pulsàtil a tercera porció duodenal compatible amb variu ectòpica sense signes de sagnat actiu. El TC abdominal confirma les troballes així com una trombosi portal i de la VMS amb formació de circulació col•lateral. Donada la gran mida de la variu, no és tributària de tractament endoscòpic ni de DPPI.

La pacient presenta bona resposta al tractament farmacològic (somatostatina) però presenta recidiva hemorràgica en dues ocasions consecutives coincidint amb la retirada del fàrmac (tot i rebre tractament combinat amb betabloquejants i nitrats), amb un ampli requeriment transfusional i un ingrés perllongat associat.

S'inicia tractament amb un anàleg de somatostatina (octreótide), aconseguint bon control de l'hemorràgia que es manté al passar a la presentació d'acció prolongada (depot), i sense aparició d'efectes secundaris rellevants. La pacient es manté estable i sense nous episodis de sagnat durant un total de 7 mesos, quan ingressa per HDA greu que no respon al tractament mèdic, èssent finalment èxitus.

Comentari:

En aquest cas clínic proposem una alternativa al tractament estàndar de l'hemorràgia digestiva per varices duodenals quan la resta de les opcions terapèutiques no estan disponibles.

Tot i que l'event final va ser l'èxitus, la pacient es va mantenir durant 7 mesos amb bona qualitat de vida i sense requerir nous ingressos per aquest motiu.

